



Krautfäule- und Alternariafungizide (Auswahl) (nach LfL – verändert)

	Präparat	g Wirkstoff pro kg bzw. l	Auf- wand- menge l bzw. kg/ha	Wir- kungs- mecha- nismus (MoA) ⁵⁾	Max. Behand- lungs- häufigk.	Krautfäulewirkung			Alternaria- wir- kung	Wirkungs- dauer	Kurativ- wirkung	Gewässerabstand in (m) Abdriftminderung% ohne (50/75/90)	Warte- zeit (Tage)	Mindest- spritzab- stand lt. Zulassung (Tage)	Preis (€/ha) ca.
						Blatt- befall	Stängel- befall	Neuzu- wachs							
Kontaktmittel	Gachinko, Leimay, Sevasdas	200 Amisulbrom	0,5	C4	6 x	☉	☉	○	○	☉	○	5 (5/5/*)	7	7	35
	Ranman Top ³⁾	160 Cyazofamid	0,5	C4	6 x	☉	☉	○	○	☉	○	5(*/*/*) (5 m bew.) ⁴⁾	7	5	42
	Cameol, Terminus ³⁾	500 Fluazinam	0,4	C5	8 x	☉	☉	○	☉	☉	○	10(5/5/*)	7	5/7	15
	Shirlan, Ohayo ³⁾	500 Fluazinam	0,4	C5	10 x	☉	☉	○	☉	☉	○	10 (5/ 5/*) (10 m bew.) ⁴⁾	7	7	17
Nur gegen Alternaria	Belanty	75 Mefentrifluconazole	1,25	G1	3 x	○	○	○	☉	☉	○	*	3	7	28
	Narita XL	500 Difenconazole	0,25	G1	4 x	○	○	○	☉	☉	○	10(5/5/*)	14	-	22
	Propulse	125 Prothioconazol 125 Fluopyram	0,5	G1+C2	3 x	○	○	○	☉	☉	○	5(*/*/*)	21	10	32
	Ortiva, Zafra AZT 250 SC u.ä. ¹⁾	250 Azoxystrobin	0,5	C3	(3/2 x) ¹⁾	○	○	○	☉		○	5(*/*/*)	7	7	13
	Zoxis Super	250 Azoxystrobin	0,25	C3	(2 x) ¹⁾	○	○	○	☉		○	*	7	7	?
	Signum ¹⁾	67 Pyraclostrobin 267 Boscalid	0,25	C2+C3	(4 x) ¹⁾	○	○	○	☉		○	5(*/*/*)	3	10	22
Teilsystem. Mittel	Carial Flex ²⁾	250 Mandipropamid 180 Cymoxanil	0,6	H5+U	3 x	☉	☉	○	○	☉	☉	*	7	7	40
	Curzate 60 WG	600 Cymoxanil	0,2	U	6 x	☉	☉	○	○	☉	☉	*	1	5	14
	Cymbal flow	225 Cymoxanil	0,5	U	6 x	☉	☉	○	○	☉	☉	*	7	7	13
	Plexus ³⁾	200 Cymoxanil 300 Fluazinam	0,6	U+C5	6 x	☉	☉	○	○	☉	☉	15(10/5/5)	7	7	?
	Reboot	330 Cymoxanil 330 Zoxamide	0,45	U+B3	3 x	☉	☉	○	☉	☉	☉	5(5/*/*) (20 m bew.) ⁴⁾	7	7	39
	Revus ²⁾	250 Mandipropamid	0,6	H5	4 x	☉	☉	○	○	☉	☉	*	7	7	33
	Revus Top ²⁾	250 Mandipropamid 250 Difenconazole	0,6	H5+G1	3 x	☉	☉	○	☉	☉	☉	5(5/5/*)	3	7	45
	Terminus Extra	200 Cymoxanil 300 Fluazinam	0,6	U+C5	6 x	☉	☉	○	○	☉	☉	15(10/5/5)	7	7	?
	Voyager ²⁾	150 Valifenalate 200 Fluazinam	1,0	H5+C5	3 x	☉	☉	○	☉	☉	☉	10(10/5/5) (10 m bew.) ⁴⁾	7	5	43
System. Mit- tel	Infinito	62,5 Fluopicolide 625 Propamocarb	1,6	F4+B5	4 x	☉	☉	☉	○	☉	☉	5(*/*/*)	14	7	49
	Omix Duo	50 Cymoxanil 335 Propamocarb	2,5	U+F4	4 x	☉	☉	☉	○	☉	☉	* (10 m bew.) ⁴⁾	14	7	30
	Simpro	50 Cymoxanil 335 Propamocarb	2,5	U+F4	4 x	☉	☉	☉	○	☉	☉	* (10 m bew.) ⁴⁾	14	7	30
	Zorvec Entecta ²⁾	48 Oxathiapiprolin 240 Amisulbrom	0,25	F9+C4	3 x	☉	☉	☉	○	☉	☉	5(5/*/*)	7	7	52

* landesspezifische Regelungen und Pflanzenschutz-Anwendungs-VO beachten! 1) Gegen das Mittel besteht eine verbreitete Resistenz bei Alternaria-Arten, daher möglichst nur 1x anwenden
2) Gegen das Mittel besteht eine Resistenzgefahr, Hinweise beachten 3) Bei der Einstufung wird von einer Fluazinam oder Cyazofamid sensitiven Phytophthora-Population ausgegangen
4) bei über 2 % Hangneigung in der Nachbarschaft zu Gewässern bewachsener Randstreifen (ohne Behandlung) je nach Mittelaufgabe von 5 m bzw. 10 m bzw. 20 m (Ausnahme Mulch- oder Direktsaat)
5) auf Resistenzen achten, gleicher Code (FRAC-Code) = gleicher Wirkungsmechanismus (MoA)